



Течение заболевания	Критерии	Лечение
Легкое, умеренной тяжести	Диарея (неоформленный стул 3 или более раз в сутки) в сочетании с болью в животе	Метронидазол 500 мг 3 раза в сутки 10 дней; в том случае, если к 5-7 дню терапии не удастся добиться улучшения в самочувствии пациента, показана смена антибиотика на ванкомицин в дозе 125 мг 4 раза в сутки на 10 дней
Тяжелое	Водянистая диарея с кровью Гипоальбуминемия < 30 г/л в сочетании с одним из следующих симптомов: -лейкоцитоз >15X10 ⁹ /л - болезненность при пальпации живота	Ванкомицин 125 мг 4 раза в сутки в сочетании с метронидазолом 500 мг 3 раза в сутки 10 дней
Осложненное	Водянистая диарея с кровью Один из нижеперечисленных симптомов: -гипотензия -лихорадка >38,5оС -илеус -изменение сознания -лейкоцитоз >25X10 ⁹ /л или менее 2X10 ⁹ /л -органный недостаточность (необходимость ИВЛ, почечная недостаточность и др)	Метронидазол 500 мг каждые 8 часов в сочетании с ванкомицином 500 мг 4 раза в сутки+ванкомицин per rectum 500 мг 4 раза в сутки 10 дней; инфузионная терапия для устранения белково-электролитных нарушений, дезинтоксикаций
Рецидив	Повторное развитие менее, чем через 8 недель после окончания терапии	Лечение при первом рецидиве проводится так же, как при первом эпизоде, в зависимости от тяжести; при последующих рецидивах легкого течения и средней тяжести – ванкомицин в начальной дозе 500-1000 мг с постепенным снижением дозы до 125 мг в сутки на протяжении 19-25 дней или ванкомицин в дозе 500 мг 10-14 дней. Затем прием препарата продолжается каждые 3 дня в течение 3-х недель по 125-500 мг

Пробиотики, содержащие лакто- и бифидумбактерии должны быть назначены на срок не менее 3-х месяцев после отмены антибактериальных препаратов